





AGROXYDE II

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.

Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.



ZALETY

- Środek dezynfekujący i odwianiający **skuteczny w twardej wodzie** w obecności protein: aktywny we wszystkich warunkach.
- **Bardzo szeroki zakres aktywności** przy dużych rozcieńczeniach, jest ekonomiczny, usuwa zanieczyszczenia bakteryjne, grzybicze i wirusowe.
- Nie pozostawia żadnych śladów, ponieważ ulega rozkładowi pod wpływem wody, tlenu i kwasu octowego: **nie wpływa na środowisko.**
- **Zgodny z Zarządzeniem Ministra,** dotyczącym środków czyszczących do materiałów mających kontakt z artykułami spożywczymi i napojami.
- Jego składniki znajdują się na liście

autoryzowanej na podstawie wytycznych CE nr 1804/1999 o produkcji biologicznej produktów rolnych.

ZASTOSOWANIE

- Przy hodowli: brojlerów i kur niosek, królików, świń, bydła rogatego, krów mlecznych, cieląt, owiec, kóz, koni...
- **Dezynfekcja powierzchni po oczyszczeniu:** materiały, pojazdy i pomieszczenia dla zwierząt, miejsca i materiały do składowania i przygotowania karmy dla zwierząt.

SPOSÓB UŻYCIA

- Puste pomieszczenia sanitarne: mury, sufity, podłogi, najbliższe okolice, poidła, pipety, koryta, obiegi wodne, klatki, pojemniki, silosy,...
- Dezynsekcja i czyszczenie oraz płukanie wstępne.
- AGROXYDE II rozcieńczyć do stężenia od **0,25% do 0,75%**
- Nakładać przez **rozpylanie, nasączenie, zmywanie**, pozostawiając na 20 minut w celu przereagowania
- Spłukać wodą, kontrolując usuwanie AGROXYDE II.
- **Brodziki z kąpielą racic i brodziki do dezynfekcji kół:** roztwór AGROXYDE II o stężeniu 0,25%, który należy codziennie odnawiać.
- Stosować z układami dozowania DOSATRON odpornej na działanie kwasu nadoctowego. Nie nadaje się do stosowania z centralą LB9.

- Środek dezynfekcyjny zawierający 216,1 g/l kwasu nadoctowego i nadtlenku wodoru.
- Spełnia wymagania norm AFNOR 72171 (środek bakteriobójczy o stężeniu 0,25%), 72301 (środek grzybobójczy o stężeniu 0,75%) i 72180 (środek wirusobójczy o stężeniu 0,25%).

BEZPIECZEŃSTWO

- Homologacja Francuskiego Ministerstwa Rolnictwa nr 2010192 przy stężeniu 0,25% (środek bakterio- i wirusobójczy) oraz przy 0,75% (środek grzybobójczy).
- Szczególnie aktywnie działa na **virus influenza** przy stężeniu **0,10%**.
- Żrący, szkodliwy
- Produkt sklasyfikowany jako podtrzymujący palenie, może spowodować pożar.
- Może zmienić wygląd niektórych podłoży, nie powodując pogorszenia własności mechanicznych w warunkach stosowania (beton, podłoża cynkowane,...).
- Okres ważności: 18 miesięcy
- Ulega rozkładowi pod wpływem wody, kwasu octowego i tlenu.
- Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki

CHARAKTERYSTYKA

- Ciecz przezroczysta, bezbarwna, mało lotna
- pH przy stężeniu 0,75% = 2,7

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO Uwaga: informacje podane w tym arkuszu są dostarczane przez nasze laboratorium w celach informacyjnych. Nie angażują one jednak naszej odpowiedzialności za wszelkie szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego stosowania produktu. Karta charakterystyki (lub certyfikat kosmetyczny) tego produktu jest dostępna bezpłatnie na naszej stronie internetowej |

07/2026

Certiphyto

Zatwierdzenie N°RH00584 dla profesjonalnej i ogólnodostępnej sprzedaży produktów fitofarmaceutycznych

FIRMA POSIADAJĄCA
SYSTEM ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
CERTYFIKOWANY
PRZEZ DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Siedziba główna CS 10039 | 42001
Saint-Étienne | France | T. +33 4 77 49 46 70
Fabryka Route de Cahors | 46100
Cambes | France | T. +33 5 65 40 02 96

www.ceetal.com

laboratoires
Ceetal